



Tups-rohtliilia pruunistunud lehetipud kõnelevad liiga kuivast õhust või vähesest kastmisest.

■ Villitaolised läbipaistvad, teravalt piiritletud plekid, osalt korgistunud: piserdatud ereda päikese käes.

■ Korkjad hallikaspruunid vohangud, mis väljenduvad tillukeste mügarike, näsade või vöötidena, mõnikord ka sisselangenud leheosadena või rakurühmade suuremise tagajärjel tekkinud aukudena: liiga suur mulla ja õhu niiskus; jahe koht; vähe valgus; liiga väike pott; liigne väetamine (kliivia, havisaba).

■ Valkjad laigud lehtedel: piserdatud väga lubjarikka veega.

Pungad ja õied

■ Pungad varisevad: suur temperatuuri kõikumine; tõmbe tuul; halb õhustamine; liiga soe; liiga pime; mullapall läbi kuivanud; taime asendit valguse suhtes muudetud.

■ Pungad ei avane: vähene õhuniiskus; vee- ja toidupuudus.

■ Õisi ei moodustu või tekib vähe: vähe väetatud; lämmastikuga üle väetatud; taimele pole antud puhkeperioodi; valed valgus- ja soojustingimused.

■ Õievarred jäävad lühikeseks: mullapall on läbi kuivanud; toitainete puudus; liiga hilja istutatud; vale muld; suur temperatuuri kõikumine; liiga jahe koht õievarte pikenedmise ajal; vale režiim puhkeajal (alpikannil, ratsuritähel).

■ Kahvatu õievärvus: liiga pime ja soe koht.

Allikas: Virve Roosti "Toalilled. 101 rohelist sõpra", (Maalehe Raamat 2006)

TASUB TEADA

REPRO



Hooghännad kahjustavad taimi vaid siis, kui neid on massiliselt.

Ebameeldiv sagimine lillepotis

Hooghändasid pole vaja eraldi tõrjuda – kõrvaldage liigniiskus potimullas, ja nad kaovad.


Kui pärast kastmist ronib lillepotis mullapinnale ja hakkab seal kirpudena kargama terve parv tillukesti (1–4 mm) hallikasvalgeid putukaid, on see üsna ebameeldiv.

Need tegelased on hooghännad. Tegelikult on nad väga kasulikud olendid, sest lagundavad toitudes orgaanilist ainet ning aitavad sel moel kaasa mulla tekkele.

Hooghännad on mulla fauna loomulik koostisosa ning põllu- ja aiapinnal väga teretulnud. Kui neid on aga lillepotis liiga palju, nii et lausa kihiseb, võivad nad hakata seal tüli tekitama.

Juhul kui hooghändadele ei jätku piisavalt toitu – mulla kogus on ju potis piiratud –, hakkavad nad sööma taime juuri. See juhtub muidugi vaid siis, kui muld on hooghändade eluks soodne ehk siis pidevalt väga niiske.

Hooghändade arvukuse vähendamiseks piisab, kui hakata taime



Hooghändade olemasolu annab märku liigsest kastmisest.

vähem kastma. Paras sagedus on selline, kui mullapind kastmiskordade vahel heledaks tõmbub. Head teeb ka mulla kobestamine.

Lisaks võib mullapinnale puistata mõne sigareti jao tubakapuru. Nõnda imbub iga kastmiskorra ajal mulda lahjat tubakaleotist, mis toimib nõrga putukatõrjevahendina. Mullale võib raputada ka peenikest kuiva liiva või puutuhka.