


Magusad paprikad

Varsti tuleb paprikaseeme mulda panna. Vanade läbiproovitud sortide kõrval on põnev proovida ka midagi uut.



'Rubinova'

Viljad on toreda ümar-lapiku kujuga ja paksu viljalihaga (6–7 mm). Täisküpsuses tumepunased. Keskvarajane saagikas sort, tärkamisest tehnilise küpsuseni kulub 130–135 päeva. Madalakasvuline, kõrgus 45 cm.



'Etiuda'

Oranžid kandilised kaunad on suured ja paksuseinalised, viljaliha magus ja mahlane. Kuna tegu pole hübriidsordiga, tasub seemneid ka ise korjata. Keskvarajane.

'Topepo Rosso'

Väikesed (30–80 g) ümmargused viljad meenutavad tomatit. Madalakasvuline, kõrgus 45–65 cm. Sobib kasvatada kilekasvuhoones. Varajane.

'Corno di Toro Rosso'

Koonusjad viljad on pikad, 20–25 cm, ja väga magusad. Neid võib tarbida nii roheline kui punasena. Seemneid võib ka ise korjata, sest tegu pole hübriidsordiga. Keskvarajane.

Maaletooja Schetelig, Selteret

TASUB TEADA

Paprika külv ja istikuperiood

- Taimede ettekasvatamiseks külvake seeme hiljemalt märtsi teisel poolel, sest paprikaistik vajab arenguks rohkem aega kui tomat.
- Kuna paprikataim talub pikeerimist halvasti (areng peatub 8–10 päevaks), on parem külvata turbatabletti või -potti, mille saab hiljem koos taimega suuremasse kasvupotti ümber tõsta.
- Ühte potti võib panna 3–4 seemet, hiljem näpistage kehvemad ära.
- Paprika idaneb aeglaselt, tärkamise kiirendamiseks võib seemet ööpäev sooja vees leotada.
- Parim idanemistemperatuur on 25° ringis.

- Tõusmed ilmuvad suhteliselt ebaühtlaselt. Tärkamise järel hoidke neid 4–5 päeva jahedamas (16–18°), et nad välja ei veniks. NB! Temperatuuril alla 13° paprikataimede areng seiskub!
- Edaspidi andke neile taas rohkem sooja: päeval 20–25°, öösel 4–5° vähem.
- Kui külvasite külvikasti ja peate taimi pikeerima, siis tehke seda 1–2 pärislehe faasis (15–20 päeva pärast tärkamist).
- Taimed vajavad kasvamisel palju valgust.
- Õige aeg istutada taimed kasvuhoonesse on siis, kui istikul on esimesed õied või isegi viljalged. Liiga noored istutatud paprikal tekib kasvu- ja arengupidurdus.