



Sinine mesiohakas.



Lamedalehine ogaputk.



Pööris-kiplill.

kui vadel kasvukohtadel. Ilupeenrale võib istutada lillade õitega purpurkäokannuse (*L. purpurea*), tema valgeõielise sordi 'Alba' ja roosa 'Canon J. Went' (mõlemad 100 cm). Õisi on neil kesksuvest oktoobrini.

Kuivale kasvukohale sobib hästi roosa neitsikummel (*Tanacetum coccineum*). Kui taim pärast õitsemist 10 cm peale tagasi lõigata, saab õieilu näha veel hilissuvelgi.

Kesksuvest varasügiseni õitsevad kipslilled (*Gypsophila*). Pööris-kiplill (*G. paniculata*) kasvab kõrgeks puhmikuks (80–100 cm). Aedkiplill 'Rosenschleier' on madalam (40 cm) ja roosade õitega. Tõeline iludus on aga roosakasvalgete õite ja kollase-rohelisekirju lehestikuga hübriidsort 'Jolien' (60 cm).

Suuri värvilaike saab varasuvest sügiseni tekitada põuakartlikule peenrale Faasseni naistenõgestega (*Nepeta faassenii*), millel on lisaks sinistele ka valgeõielisi sorte. Naistenõgesed on putukate suured lemmikud.



Faasseni naistenõges.

Madalad õievaibad

Ideaalseid päikesepüsikud on hübriid-kuldkannid (*Helianthemum hyb.*), mille sortide (kõrgus 20 cm) hulgas on hele- ja tumeroosad, punaseid, oranžikaid ning sidrun- ja tumekollaseid õisi.

Harilik käbihein (*Prunella vulgaris*) on tavaline teeservadel ja elamute ümbruses, ilupeenrale võib leida aiaarist aga suureõielisi käbiheina (*P. grandiflora*) sorte: lillakasroo-

sa 'Rubra', heleroosa 'Carminea' ja valge 'Alba'. Õisi on juunist septembrini.

Põhja-Eesti kuivadel liivastel paikadel kasvab roosade õisikunuttidega roosa merikann (*Armeria elongata*), lillepeenral säravad mais ja juunis hariliku merikanni (*A. maritima*) roosaõieline sort 'Rosea', roosa-valgekirju 'Splendens' ja valge 'Alba' (kõik 15–20 cm).