

LABORATOORIUMID



Vitacol


A-S. MAG. F. KURROT & A. BENKSON

TALLINN

SPETSIAALPREPARAADID

Preparaat	Indikatsioonid	Doos
Baume K. & B. Ungt methyl. salic. comp. Tuubid à 60,0	Arthrit. ac. et chr., rheumat. muscul. ac. et chr., ergu- ja plõiravalud.	Hõõruda 2 korda päevas nahasse. Katta vahapa- beri ja villasega.
Biresol Karbid: à 12 küünalt.	Hämorroiidid, pärasoole- ja tu- pe limanaha põletikud.	1—3 küünalt päev. pära- soole.
Calc. - Theobrom. salic. K. & B. Torud: à 20 tabl.	Arterioscler., hypertonia, asth- ma, angina pectoris, angio- spasmus, diureticum.	3—8 tabl. päev. 1/4 klaasi veega.
Ekalin Pudel.: à 75,0; vedelik	Kidurad juuksed ja kõõm.	Hõõruda peanahasse 2 korda nädalas.
Ext. Malti K. & B. Vitamiinirikas Pudel.: à 175,0	Rahhiit, seedimisrikked, nõr- kus, taastoibumine, verevaesus.	3 korda päev. 1 teelusika täis piimaga.

418888



<p>Extr. Malti c. ferro K. & B. Pudel.: à 175,0</p>	<p>Rahhiit, seedimisrikked, nõrkus, taastoibumine, verévaesus.</p>	<p>3 korda päev. 1 teelusika täis piimaga.</p>
<p>Ferratol K. & B. Fe — 0,3⁰/₀; lahtiselt ja pudel.: à 250,0</p>	<p>Verevaesus, nõrkus, taastoibumine (Rekonvaleszenz), söögiisu puudus.</p>	<p>Täiskas. 3 korda päevas 1 supil. täis, lastele 3 kor. päev. 1 dessertl. täis.</p>
<p>Ferrucoll 5% olloiidne raua-oksüüdhydr. Pudel.: à 150,0</p>	<p>Verevaesus, taastoibumine, nõrkus, alatoitus, söögiisu puudus.</p>	<p>Täiskasv. 3 kor. päev. 1 dessertl. täis, lastele 3 kor. päev. 1 teelus. täis.</p>
<p>Flavosol 3,6—diamino—10-methyl-acridiniumchlorid ja hexamethylenetetram. Torud: à 20 tabl.</p>	<p>Kurgu-(angina, diphther.), suu-, põie- ja neeruhaigus.</p>	<p>Täisk. 10 kor. päev. 1—2 tabl., lastele 10 kor. p. $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{2}$ tabl.</p>
<p>Haemo-Cerebrin-Cacao Pulber; karbid: à 250,0</p>	<p>Väsimus, liigväsimus, (sportlastel), nõirasteenia, nõrkus, unepuudus, alatoitus, verévaesus, erkude nõrkus, rahhiit, skrofuloos.</p>	<p>Täisk. 2 korda päev. 2 teelus. väit piimaga, lastele 2 korda päevas 1 teelusika täis piimaga.</p>

Preparaat	Indikatsioonid	Doos
<p>Haemoferratol Liq. Haemoglob. c. Ferro Fe—0,6%. Lahtis. ja pudel.: à 250,0</p>	<p>Verevaesus, kehvveresus, taas- toibumine, nõrkus, söögiisu- puudus, vaimline väsimus.</p>	<p>Täisk. 3 k. p. 1 supilus. täis, lastele 3 k. p. 1 tee- või dessertlus. täis.</p>
<p>Haemoferratol c. arsen. Fe—0,6%; As₂O₃—0,005% Lahtis. ja pudel.: à 250,0</p>	<p>Verevaesus, alatoitus, üldine nõrkus, erkude nõrkus, hüs- teeria.</p>	<p>Täisk. 3 k. p. 1 dessert- lusika täis, lastele 3 k. päev. 1 teelusika täis.</p>
<p>Hexarol Hexamethylentetram. 40%. Karbid; 5 amp. à 5,0</p>	<p>Angina, gripp, sepsis, menin- gitis, poliomyelitis, encephalitis, cystitis, bacteriouria, gicht, li- thiasis. Süstida veeni ja liha- sesse. Valuta.</p>	<p>—6 amp. päevas.</p>
<p>Jod-Calc.-Theobr. salic. K. & B. Torud: à 20 tabl.</p>	<p>Arterioscleros., hypertonia, as- thma bronch. et cardiale, angio- spasm., aortitis luetica, steno- cardia.</p>	<p>3 korda päevas 2 tabl. peale söögi.</p>

Kresolan

Liq. Kresoli depur. saponat. Lahtiselt.

Pleknõud: à 1 klg.

Asjade, ruumide, käte, haavale, röga, väljaheidete, pesu, talli, lauda, suu, sõrgade ja naha desinfitseerimiseks.

Tarvitatakse veega lahjendatult. 1—3 supilus. täit 1 liitri veele.

Phospharsin I & II.

Arseen-fosfor-strükniin.

Karbid: 10 amp. à 1,0.

Nõrkus, taastoibumine, tuberkuloos, nõirasteenia, alatoitus, verevaesus, väimline liigväsimus, funkts. impotents.

Süstida naha alla ehk lihasse 20 korda. Valuta.

Plasmogen

Sisaldab: Ca., Mg., Bi., Br., Ph. ja renihapet.

Karbid: à 50 ja 100 tabl

Kopsu-, näärme-, luu- jne. tiisikus.

3 korda päevas 2—3 tabl. korraga.

Rhodan-Calc.**Theobr.-salicyl.**

Torud 20 tabl. à 0,5

Essentsiaalne, klimakteeril. ja sklerootil. hüpertonia, angiospasm., stenocardia.

I nädal 3 k. p. 1 tabl.
II ja III „ 2 „ „ 1 „
IV, V, VI n. 1 „ 1 „

Sanguitenin

Karbid: 10 amp. à 2,0.

Arterioscler., hemiplegia ja epileps. arterioskl. põhjal, hüpertonia, myocarditis, angina pectoris, asthma cardiale, glaukoom, otoskleroos.

Süstida lihasse 40 korda. Valuta.

Preparaat	Indikatsioonid	Doos
<p>Sapoform Vedelik. Lahtis., pudel.: à 250,0 ja plekknõud: à 1 klgr.</p>	<p>Käte, asjade, ruumide, arsti- riistade jne. desinfitseerimi- seks, kuristamiseks, naha- ja naistehaig. ja higistamise vastu.</p>	<p>Tarvitatakse alati väliselt ja lahjendatult s. o. 1—3 supilus. täit 1 ltr. veele.</p>
<p>Sirup. Kalii sulfo- quajac. comp. K & B Sirelin. Pudel.: à 100,0</p>	<p>Catarrh. pulm., bronchitis, köha, gripp, läkaköha, kopsupõletik.</p>	<p>Täisk. 5 k. p. 1 dessert lus. täis, lastele 3 k. p. 1 teelusika täis.</p>
<p>Thymoferrol Gl. Thymus'est. Torud: 20 tabl. à 0,5</p>	<p>Skrofuloos, rahhiit, nõrkus, verevaesus, vaimline kõngu- jäamine, loidus, apaatia.</p>	<p>Lastele 6 k.—1 a. 3 k. p. 1/4 tabl. piimaga, 1 8 a. 3 k. p. 1/2 tabl. piimaga, üle 8 a. 3 k. p. 1 tabl. piim. Ravida 3—8 kuud.</p>
<p>Thyrolytin Gl. Thyroidea'st Torud: 20 tabl. à 0,5</p>	<p>Podagra, rheumatismus chr., polyarthrit., obesitas, nõiralgiad.</p>	<p>2—3 tabl. p. 1/4 klaasi veega.</p>

Varitonin

Sol. Natr. chlor. 20%-10,0
ühes anesteetikumiga.
Karbid: 2 amp. à 10,0

Veenilaiendused (varices).
Süstida veeni; kõrvale
sattudes tekitab nekroose.

Süstida 10,0 korruga.

Varitonol

Sol. Sacchar. uvici 60%-
10,0. Karbid: 2 amp. à 10,0

Veenilaiendused (varices).
Süstida veeni.

Süstida 10,0 korruga.

Verobroman

Broom—isovalerüülurea.
Torud: 20 tabl. à 0,3

Närvilikkus, unepuudus, ärrit-
tus, närviline astma, hirmu-
tunne, rahutus, südame peks-
mine, nõirasteenia, depressioon.

2—4 k. päev. 1—2 tabl.

Vitacol

Maitsev kalarasv.
Pudel.: à 125,0

Rahhiit, osteomalacia, laste
krambid, verevaesus, lympha-
denitis, skrofuloos.

Täisk. 5 k. p. 1 supilus.
täis, lastele alla 3 a. 3 k.
päev. 1 teel. täis, 3--7 a.
3 k. p. 1 dessertl. täis.
üle 7 a. 3 k. p. 1 supil. täis.

2. / 586241088

492

832

232