



**Avamaale saab taimed istutada alles pärast öökülmaohu möödumist, tavaliselt juuni esimesel poolel.**

idanevusega ning korralik hübriid-seeme on kallid.

■ Kasvusubstraadiks kasutage väetisega segatud neutraliseeritud turvast.

■ Istikute ettekasvatamise ajal on sobiv temperatuur päeval 20–25°, öösel 17–18°.

■ Esimese pärislehe ilmumisel hakake taimedele andma vedelväetist. Kasutage vees kergesti lahustuvat mineraalväetist (0,1–0,2% lahusena), sobib ka virtsa- või sõnnikuleotise lahus.

■ Kasvuhoones või lavas istikuid kasvatades valgusest harilikult puudus pole. Kuid toas aknalaul on oht, et taimed venivad vähese valguse ja kõrge temperatuuri tõttu välja. Sellistelt taimedelt enam korralikku saaki ei saa.

■ Sobiv aeg avamaale istutamiseks on siis, kui taimel on arenenud 1–2 pärislehte. Olenevalt kasvutingimustest kulub selleks alates külvist 18–25 päeva.

■ Peenrale võib istutada ka vanemaid taimi, millel on juba 3–4 pärislehte, kuid siis peaks istikuid kasvatama suurema läbimõõduga (8–12 cm) pottides. Suuremad taimed ei talu nii hästi ümberistutamist, nad juurduvad aeglasemalt ja istutusjärgne kasvuseisak on pikem. Samuti on suuri taimi pärast istutamist looriga kattes oht, et lehed saavad muljuda.

■ Mõni päev enne välja istutamist tuleks taimi väliskeskkonnaga harjutamiseks karastada. Selleks õhustage kasvuhoonet või lava rohkem kui tavaliselt ning kastke taimi vähem.

Avamaale saab taimed istutada alles pärast öökülmaohu möödumist. Tavaliselt on selleks sobiv aeg juuni esimesel poolel. Otstarbekas on kurk panna peenrale teise kultuurina, kui varakevadadel külvatud redis või aedsalat on koristatud.

### Kuidas istutada

■ Istutage sooja, tuulevaikse ja pilvise ilmaga.

■ Istik pange kuni idulehtedeni mulda, see soodustab külguurte teket.

■ Taimede vahele jätke reas 20–30 cm, ridade vahele 1,2–1,5 m.

■ Taimede tihedus sõltub ka mullast: raskemal savimullal on taimed väiksemad ning need võib istutada veidi tihedamalt.

■ Peenral võib kasutada kilemultši, mis hoiab mulla niiskema ja soojemana ega lase sel umbrohtuda. Katke peenar kilega, lõigake sobivatesse kohtadesse augud ja istutage.

■ Pärast istutamist kastke taimi korralikult ja laotage kohe peale ka katteloort. Loori all kasvanud taimed annavad esimese saagi kuni kaks nädalat varem.

■ Partenokarpsetel (iseviljuvatel) sortidel võib loori peal hoida kogu kasvuaja ning isegi saagikoristuse perioodil, kuigi siis on tülikas iga kord kurke korjates loori ära võtta ja jälle tagasi panna.

■ Nendelt sortidelt, mis vajavad tolmeldamiseks putukaid (nt Libelle' F.), tuleb katteloort õitsemise ajal ära võtta või siis eemaldada see vähemalt päeval.

## SOOVITUS

### Teejuht kurgikasvatajale

“Maalehe kurgiraamat” annab ülevaate hariliku kurgi kasvatamisest avamaal, kasvuhoo-nes, toas ja rõdul. Nii väike- tootja kui hobiaednik saab teada, milliseid kasvutingimusi kurk vajab, kuidas taimi ette kasvatada, istutada, kasvuajal hooldada, saaki koristada jne. Millised on haigused ja kahjurid ning kuidas neid tõrjuda; milles väljendub tooteelementide puudus ja mis sel puhul aitab. Kirjeldatud sortide hulka on valitud uuemad ja haiguste suhtes vastupidavamad.

Käsiraamat tutvustab ka veidi isemoodi kurke: meh- hiko pisikurki, karvast kurki, armeenia kurki, kollast kurki ja lääne-india kurki.

Teose autor Priit Põldma on Eesti Maaülikooli lektor. Tema peamine uurimisvaldkond on köögiviljakasvatuse tehnoloogiad.



Otse peenrale külvamiseks on sobivaim aeg mai lõpus – juuni algul, kui mulla pealmine kiht on soojenenud 10–12°ni. Liiga külma mulda külvatud seeme ei idane ja võib mädanema minna.

Seeme pange niiskesse mulda 2–3 cm sügavusele. Külv katke kohe looriga. Optimaalsetes kasvuoludes tärkab kurk umbes nädalaga.

Allikas: “Maalehe kurgiraamat”