



ELLE AHSE

▲ Paremäl avanev õienupp on terve ja sale, vasakul aga ümardunud: seda avades on näha paksääse aplaid vastseid.

◀ Sellel fotol on näha, kui ilusad saledad peavad olema lihtõelise päevaliilia nupud.

REPRO

tud, on siiski kasulik teada, et ta tekitab iiristele täpselt samasuguseid kahjustusi nagu päevaliiliatele päevaliilia-kärbes. Ka kahjustuspilt on samasugune – kahjuri olemasolust annavad tunnistust moonduvad õiepungad. Need tuleb ära korjata ning põletada, et takistada kahjurit paljunemist ning levikut.

Uut taime uurige hoolikalt

Taimekahjurit olemasolu ei tähenda seda, et peaksime loobuma oma lemmiklillede kasvatamisest. Kahjureid on vaja lihtsalt tunda ning teada, milliseid kahjustusi nad võivad põhjustada, kuidas neid hävitada ning millised on ennetusmeetmed, et levikut piirata.

Taimi ostes või tuttavate käest saades tasub olla äärmiselt hoolikas ning neid enne istutamist põhjalikult vaadelda. Kõigisse kahtlasesse taimeosadesse suhtuge suure tähelepanuga.

■ Lõigake välja ja desinfitseerige kõik kahjustunud, hallitanud, pe-

meks muutunud või kummaliste plekkidega taimeosad.

■ Eemaldage surnud juured ja kuivanud lehed. Potitaimedel tuleb niikuinii lahti harutada tihedaks muutunud ja keerdunud juurepallid.

■ Ärge istutage pehmeid tohletanud lillesibulaid.

■ Kõiki uusi taimi võiks enne istutamist paar tundi leotada keskmiselt lillas kaaliumpermanganaadi lahuses, kuhu on purustatud paar küüslauguküünt. See lihtne võte aitab sageli ära hoida palju ebameeldivusi. Me ei tea ju kunagi, mida võib sisaldada võõras muld.

Kui aga leiate mingi haiguskolde või tekib kahtlus kahjurit olemasolule, kasutage enne istutamist hoopis tõhusamaid mürgkemikaalet, vajadusel konsulteerige taimekaitse asjatundjaga.

Iga lillehuviline peaks looma endale taimede karantiinirurga ja vaatama kogu saadu väga tähelepanelikult üle.



Paksääse vastsed hävitavad punga pehmeid kudesid ja imevad mahla.

ELLE AHSE